

Sudanell 477

Tamaño: Muy grande.

Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado y su base ligeramente aplastada.

Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Ápice redondeado con el **punto pistilar** hundido dentro de la sutura. A veces presenta mamelón con cubeta en su base en todos sus lados.

Sutura: Marcada por un surco el cual es casi superficial en su mitad inferior y más marcado en el resto llegando a ser hendida en su tercio superior. En algún caso aislado está teñida del color de la chapa.

Cavidad peduncular: Profunda y medianamente ancha.

Piel: Velloso, de pubescencia muy abundante, larga y anteada. **Color:** Domina el amarillo anaranjado del fondo. Carecen de chapa aunque alguna vez presentan punteado de rojo ciclamen desvaído con estrías o pinceladas muy suaves o difusas. La chapa cubre una parte muy pequeña de la superficie dejando entrever muy bien el fondo.

Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Las características del sabor y textura de la carne no se apreciaron por llegar las muestras muy verdes.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con mucrón largo y afilado. Surco dorsal ancho y profundo. Cresta ventral algo saliente. Superficie esponjosa, bastante esculpida con surcos muy anchos y profundos, siendo más largos y numerosos cerca del ápice, junto al surco dorsal y al lado de la cresta ventral. El resto de la superficie con orificios profundos y surcos más cortos. Polo peduncular abierto.

Maduración: según datos locales, la tercera decena de agosto en Sudanell (Lérida).

